



# EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Ministério da Educação  
Universidade Federal de Santa Maria  
Hospital Universitário de Santa Maria/EBSERH  
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente  
Unidade de Vigilância em Saúde  
Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar  
SVSSP/UVS/NVEH



## QUIMIOPROFLAXIA EM MENINGITES BACTERIANAS

### 1- Meningite Meningocócica:

#### 1.1- Indicações:

- Contatos próximos = moradores do mesmo domicílio, indivíduos que compartilham o mesmo dormitório (em alojamentos, quartéis, enfermarias, entre outros), comunicantes de creches e escolas, e pessoas diretamente expostas às secreções do paciente.
- NÃO há recomendação para os profissionais da área de saúde que atenderam o caso de doença meningocócica, exceto para aqueles que realizaram procedimentos invasivos (intubação orotraqueal, passagem de cateter nasogástrico) sem utilização de equipamento de proteção individual adequado (EPI).

#### 1.2- Quimioprofilaxia

##### Rifampicina

<1 mês 5mg/kg/dose 12 em 12 horas 2 dias

Crianças ≥1 mês e adultos 10mg/kg/dose (máximo de 600mg) 12 em 12 horas

##### Ceftriaxona Dose única

<12 anos 125mg; intramuscular

≥12 anos 250mg; intramuscular

**Ciprofloxacino** >18 anos 500mg; uso oral Dose única

### 2- Meningite por *Haemophylus influenzae*:

#### 2.1- Indicações:

- Contatos próximos, atenção quando houver crianças menores de 02 anos susceptíveis (não vacinada ou vacinação incompleta). Neste caso fazer profilaxia em todas as faixas etárias que se expuseram ao caso índice.
- Creche que não há crianças menores de 02 anos não se recomenda quimioprofilaxia, a menos que ocorra 02 ou mais casos em um período de 60 dias.
- Para os profissionais de saúde é necessário APENAS quando realizar intubação orotraqueal, aspiração de secreções respiratórias realizados sem EPI.

#### 2.2- Quimioprofilaxia:

- Rifampicina 20mg/kg/dia para crianças e 600g/dia para adultos por 4dias.

### 3- Disposições Gerais:

A quimioprofilaxia deve ser administrada em dose adequada e simultaneamente a todos os contatos próximos, **preferencialmente até 48 horas da exposição ao doente, podendo se estender até 10 dias**, considerando o prazo de transmissibilidade e o período de incubação da doença, no sentido de eliminar o estado de portador. A medicação está disponível na farmácia do HUSM e nas secretarias municipais de saúde.

#### Referencia Bibliográfica:

- Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica, 1ª ed atualizada, 2016.